

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТОМ ФОРТРАНС

- За 3 дня до исследования исключить из рациона питания свежие овощи, фрукты, бобовые, молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных, черный хлеб-безшлаковая диета. Если вы страдаете запорами, то за 2-3 дня до основной подготовки к исследованию, рекомендован прием слабительных препаратов (гутталакс, дюфалак).
- Накануне исследования последний прием пищи не позже 13-00. Ужин исключен. Растворить 4 пакетика Фортранса в 4-х литрах воды (1 пакетик на 1 литр, каждый литр отдельно). 4 пакетика из расчета на 75 кг веса, если вес более 90 кг, то необходим прием 5-го пакета. Прием раствора начинать накануне дня исследования. С 15 часов до 19 часов, принимать по 1 литру препарата в час, по 1 стакану, каждые 15-20 минут. Для улучшения вкуса можно добавить сок лимона или грейпфрукта.
- Утром, в день проведения исследования, сделать 2 очистительные клизмы (кружкой Эсмарха-грелка) по 1-1,5 литра, до чистой воды. В день проведения исследования разрешен легкий завтрак (сладкий чай с бутербродом), прием лекарственных препаратов в обычной дозе, которые постоянно принимаются.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОЛОНОСКОПИИ ПРЕПАРАТОМ «МОВИПРЕП»

КОЛОНОСКОПИЯ НАЗНАЧЕНА С 10-30Ч ДО 14-30Ч

- За 3 дня до исследования исключить из рациона питания свежие овощи, фрукты (яблоки, киви, виноград, помидоры, свекла, зелень), «красящие» напитки (сок томатный, гранатовый, черничный, черный кофе, кока-кола и др.), черный хлеб, грибы, фасоль, горох, орехи, крупы, лекарственные препараты железа и активированный уголь.
РАЗРЕШАЕТСЯ: светлый бульон, манная каша, вареное яйцо, омлет, отварное мясо, рыба, сыр, масло, кисломолочные продукты, кроме твердого творога.
Если вы страдаете запорами, то за 2-3 дня до исследования целесообразен прием слабительных препаратов, которыми вы пользовались раньше.
- Накануне исследования последний прием пищи не позже 13-00. Ужин исключен, разрешается только прозрачная жидкость, (вода, негазированные напитки, чай)
Содержимое одного сашеА и одного сашеВ постепенно растворить в 1 литре воды и принять раствор с 20-00ч до 21-00ч каждые 10-15 минут,

запивая 500 мл прозрачной жидкости (вода, негазированные напитки, чай).
Объем принятой жидкости составит 1,5 литра.

- Утром в день проведения исследования завтрак запрещен. Содержимое оставшегося сашеА и сашеВ постепенно растворить в 1 литре воды и принять раствор с 6-00ч до 7-00ч каждые 10-15 минут, запивая 500 мл прозрачной жидкости (вода, негазированные напитки, чай). Объем принятой жидкости составит 1,5 литра.