

Подготовка препаратом ЭЗИКЛЕН

Подготовка ДВУХЭТАПНАЯ.

СХЕМА двухэтапного приема препарата.

500 мл. раствора: Флакон вылить в емкость и добавить воды до 500 мл. В течение следующего часа выпить 1 литр разрешенной жидкости (сок без мякоти, не концентрированный компот, вода).

Начало исследования	Прием первой дозы — день накануне процедуры		Прием второй дозы — в день процедуры	
	Раствор препарата выпить медленно в течение 30-60 минут	Разрешенная жидкость 1 литр.	Раствор препарата выпить медленно в течение 30-60 минут	Разрешенная жидкость в объеме 1 литр.
С 11-30 до 12 часов	Прием препарата начинаем с 19 до 20 часов	Дополнительная жидкость принимается с 20 до 21 часа	Прием препарата начинаем с 6 до 7 часов утра	Дополнительно принимается с 7 до 8 часов утра

Дополнительные рекомендации по подготовке.

-

Необходимо при подготовке дома рассчитывать соответствующий временной интервал для поездки в клинику.

– НЕЛЬЗЯ уменьшать объемы воды для приготовления раствора Эзиклен и жидкости: сначала раствор, потом — жидкость.

- **НЕОБХОДИМО** соблюдать последовательность приема раствора Эзиклен и жидкости: сначала раствор, потом — жидкость.
- **НЕОБХОДИМО** раствор Эзиклен выпить **МЕДЛЕННО**, строго в течение **30-60** минут с момента его приготовления.
- **НЕЛЬЗЯ** хранить уже разведенный раствор.
- **НЕОБХОДИМО** во время приема раствора соблюдать двигательную активность: ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в стороны, вперед-назад, приседания.